

"L'Echange", Revue Linnéenne

Numéro spécial

M. PIC, Rédacteur

Opuscula martialia


XII

(29 Mars 1944)

MOULINS

" LES IMPRIMERIES RÉUNIES "

15, RUE D'ENGHIEN, 15



late nigro vittato, thorace testaceo, nigro trinotato, antennis ad basin pedibusque testaceis, pygidio nigro aut pro parte testaceo. L. 6-7 mill. Mauritanie. — Voisin de *nobiliata* Gerst., mais bordure dorée des élytres peu marquée, dessous foncé, cuisses sans macule brune.

Parapophyllia læviuscula v. n. purpureipennis [Phyt.] Avant-corps brillant, jaune avec la tête à bande médiane, le thorax avec 3 macules noires, élytres pourprés, pattes et dessous du corps testacés, méta-sternum un peu rembruni. Erythrée.

Liostylus interruptus n. sp. [Cleride]. Minutus, elongatus, nitidus, rufo-piceus, elytris rufis, ad medium sat late piceo fasciatis, membris testaceis; thorace elongato, postice strangulato, elytris parum elongatis, ad medium transverse depressis et antice paulo gibbulosis, in singulo post medium fascia eburnea interrupta ornatis, antice fortiter, postice minute, punctatis. L. 3 mill. Madagascar. — Voisin de *quadripartitus* Frm., en diffère par la fascie éburnée divisée, les élytres plus courts, etc.

L. atricolor v. n. Lebisi. Minutus, elongatus, nitidus, niger, elytris vage viridescentibus, capite antice, antennis pedibusque pro parte rufis; thorace elongato, postice strangulato; elytris elongatis, ad medium paulo depressis, ad basin ultra medium sat minute lineato-punctatis, postice minute punctatis. L. 3 mill. Madagascar. — Diffère de *atricolor* Pic par la tête nettement bicolore, les pattes moins foncées.

Lissaulicus nigroapicalis n. sp. [Cleride]. Elongatus, postice attenuatus, nitidus, rufus, clava antennarum et tibiis pro parte nigris, elytris apice minute nigro notatis, diverse, pro parte fortiter, punctatis; thorace sat lato. L. 8 mill. Madagascar. — Caractérisé, à première vue, par les élytres marqués de noir au sommet.

L. bicoloripes n. sp. Parum latus, postice attenuatus,

nitidus, rufus, clava antennarum, geniculis, tibiis apice tarsisque nigris; thorace parum transverso; elytris irregulariter punctatis, ad basin intus reducte et fortiter lineato-punctatis, paulo impressis. L. 8 mill. Madagascar. — Diffère de *attenuatus* Pic par les pattes en majeure partie rousses et la sculpture des élytres.

Tricladus ater n. sp. [Cleride]. Elongatus, parallelus, nitidus, niger; articulis duobus penultimis antennarum elongatis et longe prolongatis, ultimo longissimo et depresso; thorace minute et dense punctato; elytris sat minute et pro parte lineato-punctatis. L. 6 mill. Madagascar. — Voisin de *metallicus* Pic, en diffère, à première vue, par les élytres non métalliques et concolores.

T. testaceipes n. sp. Elongatus, parallelus, parum nitidus, nigro-cœrulescens, antennis (clava nigra) pedibusque testaceis; capite thoraceque fortiter et dense punctatis; elytris sat fortiter pro parte lineato-punctatis, apice minute punctatis. L. 8 mill. Madagascar. — Caractérisé par ses élytres concolores et ses pattes claires.

Discodon angusticolle n. sp. [Malac.]. Elongatus, niger, supra rufus aut testaceus, membris nigris, antennis apice flavis, gracilibus, thorace sat elongato et angustato, lateraliter subsinuato; elytris minute ruguloso-punctatis, costulatis. L. 8 mill. Bornéo. — Diffère de *reducteapicale* Pic par les élytres concolores, le thorax plus long, la tête rousse.

D. alboterminale n. sp. Parum elongatus, nitidus, rufus, capite pro majore parte, elytris membrisque nigris, abdomine aliquot medio obscuriore, articulis ultimis antennarum albidis; thorace sat breve et lato; elytris minute et dense rugulosis, sutura et margina externa paulo elevatis. L. 8 mill. Bornéo (Salangor Museum et coll. Pic).

— Voisin de *Rouyeri* Pic, mais antennes flaves au sommet.

Cantharis opacicollis n. sp. [Malac.]. Angustatus, parum nitidus, niger, capite thoraceque opacis, illo rufo ; capite elongato et angustato, thorace subquadrato ; elytris thorace valde latioribus, elongatis, costulatis, ad humeros rufescentibus, membris simplicibus. L. 7 mill. Bornéo. — Très caractérisé par son avant-corps opaque, la tête longue et étroite.

C. subopacicollis n. sp. Elongatus, pro parte opacus, griseo pubescens, niger, thorace postice testaceo marginato, elytris luteis ; capite valde ♂, aut paulo ♀, thorace latiore, dense punctato, mandibulis testaceis ; antennis gracilibus ; thorace elongato, paulo inæquale, dense punctato ; elytris minute sat dense ruguloso-punctatis ; unguibus simplicibus. L. 5-6 mill. Bornéo (Salangor Muséum et coll. Pic). — Peut se placer près de *granulaticeps* Pic.

Le **C. subopaciceps** mihi, de Bornéo, de coloration analogue au précédent, avec le thorax plus largement clair postérieurement et les cuisses testacées, a les élytres un peu plus longs et costulés.

C. subcorticollis n. sp. Elongatus, nitidus, nigro-fuliginosus, aliquot pro parte paulo rufescens, capite infra oculos flavo, femoribus testaceis ; thorace obcordato, angulis posticis distinctis ; elytris thorace valde latioribus, elongatis, minute granuloso-punctatis, aliquot subcostulatis. L. 6-7 mill. Bornéo. — Espèce caractérisée par son thorax se rapprochant de celui du genre *Xenothemus* Brg.

C. Pendlburyi v. n. **uniformis**. Angustatus, nitidus, diverse testaceus, membris pro majore parte nigris, elytris testaceis (*uniformis*), aut brunnescentibus (v. *pahangana*) ; thorace parum elongato, antice arcuato. L. 6,5-

10 mill. Presqu'île Malaise (Salangor Museum et coll. Pic).

Podabrinus costatipennis n. p. [Malac.] (1). Angustatus, paulo nitidus, niger, thorace rubro, elongato, antice attenuato; antennis gracilibus, impressis; unguibus pro parte fassis. L. 9 mill. Bornéo. — Bien caractérisé par ses élytres costés.

P. Pendlburyi n. sp. Elongatus, nitidus, niger, elytris viride-metallicis, pedibus pro parte rufis, aliquot nigris; thorace nigro (*forma typica*), aut rufo (v. *bipartitipes*), illo parum elongato, lateraliter paulo emarginato; antennis sat gracilibus; elytris elongatis, sat minute et dense ruguloso-punctatis; unguibus diverse et pro parte fassis. L. 6-6,5 mill. Bornéo (Salangor Museum et coll. Pic). — Peut se placer près de *atriceps* Pic.

P. lateniger n. sp. Elongatus, nitidus, niger, pedibus diverse rufis; thorace nigro (*forma typica*) aut rufo (v. *nigrocephalus*), illo parum elongato, lateraliter paulo emarginato; antennis sat gracilibus; elytris elongatis, minute et dense ruguloso-punctatis; unguibus diverse aut pro parte fassis. Bornéo. — Voisin du précédent comme forme, coloration différente.

Cantharis longioricornis n. sp. Valde angustatus, subopacus, niger, thorace postice testaceo marginato, elytris luteis, antennis nigris, ad medium diverse testaceis, his gracilibus et longissimis; capite cum oculis thorace latiore, illo obconico; elytris longissimis, minute et dense punctatis, subcostulatis. L. 12 mill. Bornéo (Salangor Museum et coll. Pic). — Caractérisé par ses très longues antennes en partie testacées.

Chauliognathus multisignaticollis n. sp. [Malac.].

(1) Cette espèce et les suivantes ont la tête avec les yeux grands, plus large que le thorax.

Parum elongatus, postice attenuatus, subnitidus, luteus, capite, antennis tarsisque nigris, thorace novem nigro maculato, elytris in disco post medium, in singulo, minute nigro maculatis. L. 8 mill. Mexique. — Voisin de *erratus* Er., très distinct par le thorax multimaculé.

• *C. reductipennis* mihi, du Brésil, voisin du précédent par sa forme, mais avec l'abdomen débordant un peu les élytres, a le thorax multimaculé de noir et les élytres jaunes ont, sur chacun, au milieu de la base, une macule noire assez large.

C. subapicalis v. n. *latesellatus*. Elongatus, niger, thorace circa late, elytris ad medium late et abdomine pro parte luteis, Mexique. — Voisine de la *var. curtemarginatus* mihi.

C. cardiaspis v. n. *suturalejunctus*. Les macules noires des élytres sont étroitement jointes entre elles sur la suture. Brésil.

C. lycasiformis n. sp. Oblongo-subovatus, parum nitidus, capite, infra corpore et membris pro parte nigris, pro parte luteis; thorace transverso, luteo, medio late nigro, scutello luteo, elytris luteis, in singulo ad basin transverse, post medium in disco et ante apicem reducte nigro maculatis, his in disco excavatis, postice lateraliter arcuate dilatatis, apice attenuatis, et paulo dehiscentibus, postice pustulosis. L. 14 mill. Brésil. — A placer près de *spinipennis* Pic.

Attalus apalochroides n. sp. [Malac.]. Oblongo-elongatus, postice paulo latior, breve griseo pubescens, pro parte semi-hirsutus, viride-metallicus, elytris pro parte cyaneis, pro parte purpureis, abdomine membrisque testaceis; capite thoraceque robustis, nitidis, parum punctatis; antennis elongatis, articulis pro parte dentatis; elytris parum elongatis, depressis, paulo fortiter et dense punctatis, pro parte irregulariter plicatis, L. 4 m. Congo.

— Caractérisé par sa particulière sculpture élytrale, rappelant celle de certains *Apalochrus* Er. conjointement avec ses membres clairs.

Lucidina Boucardi n. sp. [Lampyr.]. Parum elongatus, niger, thorace roseo binotato, infra corpore pro majore parte roseo ; antennis sat elongatis, depressis ; thorace parum lato, antice attenuato ; elytris subparallelis, dense punctatis, aliquot antice vage costulatis. L. 5 mill. Lugano. — Voisin de *malaccana* Pic, forme plus parallèle, thorax autrement coloré.

L. angusticollis n. sp. Elongatus et angustatus, niger, thorace medio et infra corpore pro majore parte roseis ; thorace sat angustato ; antennis longissimis, deplanatis. L. 7-8 mill. Bornéo (Salangor Museum et coll. Pic). — Plus grand que le précédent avec les antennes et les élytres plus longs.

L. testaceipes n. sp. Valde angustatus et elongatus, niger, thorace, infra corpore, femoribus tibiisque pro parte testaceis ; thorace sat angustato ; antennis longissimis, explanatis ; elytris subparallelis, apice paulo attenuatis. L. 5 mill. Bornéo. — Caractérisé par les pattes en partie claires, la forme très étroite.

L. Wallacei n. sp. Parum elongatus, niger, thorace (circa brunneo marginato) abdomineque roseis, pedibus nigris, coxis et trochanteribus testaceis ; antennis brevibus, deplanatis ; thorace transverso ; elytris minute costatis. L. 7 mill. Singapore. — A placer près de *Clavareai* E. Ol.

L. multicostulata n. sp. Elongatus, subparallelus, attenuatus, niger, thorace abdomineque pro majore parte roseis, illo apice nigro ; antennis parum elongatis, late depressis ; thorace sat breve et lato, antice medio paulo prolongato ; elytris, postice exceptis, multi costulatis.

L. 10 mill. Java. — Plus large que le précédent, antennes plus aplaties, etc.

L. bogorensis n. sp. Parum elongatus, rufo-piceus, thorace abdomineque luteis, antennis ad basin infra femoribusque pro majorę parte testaceis; antennis late flabellatis; thorace breve et lato, antice attenuato; elytris unicostatis. L. 9 mill. Bogor. — Très distinct des précédents par sa structure antennaire.

L. flabellata mihi, de Bornéo, voisin du précédent par sa structure antennaire, est plus grand avec la poitrine et les pattes plus foncées.

Glenea Donckieri n. sp. [Long.]. Parum elongatus, postice attenuatus, niger, capite bi et thorace tri albo lineatis, elytris ad suturam et lateraliter albo lineatis, ad medium albo maculatis; infra corpore pro parte dense albo; femoribus rufis. L. 10 mill. Batjjan. — Voisin de *venusta* Guer., en diffère par le front noir, les dessins blancs.

G. Le Moulti n. sp. Elongatus, postice attenuatus, parum nitidus, niger, capite bi et thorace tri griseo lineatis, elytris ad suturam griseo lineatis et in singulo griseo 4 (1, 2, paulo oblique dispositis, 1) griseis, apice griseo marginatis; infra corpore albo, nigro notato. L. 10 mill. Java. — Forme de *clavifera* Aur., dessins très différents.

Glenea medana n. sp. Parum elongatus, postice valde attenuatus, nitidus, paulo pubescens, niger, elytris testaceis, in disco postice reducte nigro lineatis, lateraliter nigro marginatis, ad suturam late luteo lineatis, infra humeros anguste et reducte luteo lineatis, pedibus testaceis; capite antice tri, postice bi, et thorace tri luteo vittatis; antennis nigris. L. 7 mill. Sumatra. — Dessins des élytres particuliers.

Oxacis Titschacki n. sp. [Héter.]. Nitidus, angusta-

tus, minute griseo pubescens, rufescens, pro parte et diverse obscurus, infra corpore obscuriore. L. 11-12 mill. Pérou (Mus. Hambourg et coll. Pic). — Peut se placer près de *angustata* Chp., caractérisé par sa forme très allongée et la sculpture (avec costules et callosités déprimées brillantes) des élytres.


Anthicus (Ischyropalpus) Titschacki n. sp. [Héter.]. Grandis, elongatus, nitidus, sparse griseo pubescens, rufus, aliquot pro parte brunnescens. L. 4-45 mill. Pérou (Mus. Hambourg et coll. Pic). — A placer près de *Curtisi* Sol. en diffère nettement par la coloration générale rousse.

Mecynotarsus laticornis n. sp. [Héter.]. Parum elongatus, paulo nitidus, griseo pubescens, testaceus, elytris in singulo ad basin minute nigro maculatis, post medium nigro fasciatis et ante apicem nigro maculatis, fascia et maculis posticis ad suturam junctis; thorace breve et lato, cornu lato, oculis nigris; elytris antice subparallelis, fortiter punctatis. L. 2,5 mill. Indes MÉR. — Caractérisé par le dessin des élytres et la large corne thoracique.

Scaptia Nathani n. sp. [Héter.]. Elongatus, subparallelus, nitidus, testaceus, capite paulo rufescente; antennis parum gracilibus; capite thoraceque fortiter sat dense punctatis, illo transverso, distincte triimpresso; elytris sat minute non dense punctatis. L. 2,5 mill. Indes MÉR. — A placer près de *infima* Pic, thorax plus nettement impressionné et plus fortement ponctué.

S. curta n. sp. Subelongatus, nitidus, testaceus, capite paulo rufescente; thorace transverso, minute punctato, distincte triimpresso; elytris minutissime punctatis. L. 2,5 mill. Japon. — Voisin de *dimidiata* Mars., distinct, à première vue, par ses élytres concolores.

S. angustior n. sp. Valde angustatus, nitidus, rufobrunnescens, capite paulo obscuriore; thorace elytris dis-



tincte angustiore, fortiter et dense punctato, postice late et transverse impresso ; elytris fortiter et dense punctatis. L. 4 mill. Japon : Yesso. — Espèce caractérisée par sa forme étroite, son thorax distinctement moins large que les élytres.

S. Nodieri n. sp. Elongatus, subparallelus, nitidus, testaceus, thorace medio paulo obscuriore, illo valde transverso, minute et dense punctato, postice distincte triimpresso ; elytris sat minute punctatis. L. 3 mill. Hanoï. — Voisin de *binhana* Pic, élytres moins fortement ponctués et sans impressions basales nettes.

S. obscuricolor n. sp. Subdepressus, parum elongatus, nitidus, brunneo-piceus, elytris pallidioribus, capite antice et membris testaceis ; capite thoraceque parum fortiter sat dense punctatis, illo elytris parum angustiore, postice mediocre impresso ; elytris parum fortiter et dense punctatis, ad basin impressis. L. 3,5 mill. Ceylan. — A placer près de *indica* Mots.

S. Horni n. sp. Parum elongatus, subconvexus, nitidus, testaceus ; capite fortiter punctato ; thorace valde transverso, elytris paulo angustiore, fortiter sat dense punctato, postice paulo triimpresso ; elytris ad basin impressis, sat minute et dense punctatis. L. 2,5 mill. Ceylan. — Caractérisé par sa petite taille et sa coloration générale claire.

S. distincta n. sp. Elongatus, nitidus, testaceus, aut paulo rufescens, capite aliquot obscuriore ; thorace sat lato, elytris paulo angustiore, fortiter non dense punctato, postice triimpresso ; elytris elongatis, parum minute punctatis. L. 3,5 mill. Chine. — Plus long que *chinensis* Pic avec les impressions du thorax plus grandes.

S. luteosignata n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, luteus, thorace elytrisque nigris, his ad suturam, in singulo ad basin et post medium luteo signatis ; capite minute

et sparse punctato, oculis distantibus; thorace elytris distincte angustiore, breve et lato, fortiter et dense punctato, postice lateraliter late et medio transverse impresso; elytris non parallelis, parum fortiter non dense punctatis. L. 5 mill. Congo. — Voisin de *suturalis* Pic, avec une coloration particulière.

Brasilium obscurum n. sp. [Héter.]. Oblongus, nitidus, piceo-brunneus, vage metallicus, antennis nigris; thorace æquale, parum fortiter sat sparse punctato, elytris angustiore, elytris non parallelis, supra paulo depressis, parum fortiter sat dense punctatis. L. 5 mill. Brésil. — Diffère de *atricorne* Pic par le thorax égal, les élytres non subparallèles et un peu déprimés en dessus.

Platamops Gounellei n. sp. [Héter.]. Angustatus, nitidus, longe pilosus, castaneus, in elytris pro parte pallidior, paulo metallico mixtus; antennis nigris, articulis 5 et sequentibus latioribus; thorace elongato, postice attenuato, lateraliter distincte dentato et piloso; elytris elongatis, postice atténuatis, antice impressis, diverse et sparse punctatis. L. 5 mill. Brésil. — Voisin de *setosus* Chp., forme différente, élytres moins atténués postérieurement, etc.

P. laticollis n. sp. Elongatus, nitidus, longe pilosus, piceus, elytris rufescentibus, pedibus rufis, antennis piceis, elongatis, apice latioribus; thorace sat breve et lato, dense punctato; elytris elongatis, postice attenuatis, antice impressis, minute et sparse punctatis. L. 1,5 mill. Brésil. — Moins étroit que le précédent, thorax plus court et plus large, etc.

P. mediofasciatus n. sp. Elongatus, nitidus, longe pilosus, rufescens, elytris ad medium piceo fasciatis, antennis brunneis, subfiliformibus; thorace parum elongato, dense punctato, lateraliter paulo denticulato; elytris sat brevibus, antice impressis, diverse et sparse punc-

tatis. L. 3 mill. Brésil. — Caractérisé par ses élytres relativement courts et unifasciés.

Allecula luteimembris n. sp. [Héter.]. Oblongo-elongatus, nitidus, nigro-subæneus, capite antice membrisque luteis; thorace non transverso, antice attenuato, parum fortiter et dense punctato; elytris thorace valde latioribus, elongatis, postice attenuatis, striato-punctatis, intervallis subconvexis, minute punctatis. L. 8 mill. Pahang. — Voisin de *formosana* Pic, mais les pattes sont entièrement claires.

A. laosensis n. sp., du Laos, voisin du précédent, est plus allongé et un peu plus grand, le thorax est moins étroit, plus finement ponctué et les cuisses sont foncées à leur extrémité.

A. Perroti n. sp. Elongatus, nitidus, nigro-æneus, capite antice membrisque luteis, femoribus apice piceis; thorace sat angustato, fortiter et dense punctato; elytris thorace valde latioribus, elongatis, postice attenuatis, striato-punctatis, intervallis subconvexis, minute punctatis. L. 9 mill. Tonkin. — Voisin des précédents.

A. bicoloricornis n. sp. Elongatus, nitidus, nigro-metallicus, elytris castaneo-metallicis, antennis luteis, ad basin nigris, pedibus luteis, femoribus apice piceis; thorace parum elongato, fortiter et dense punctato; elytris thorace valde latioribus, ad suturam paulo depressis, postice valde attenuatis, striato-punctatis, intervallis subconvexis, punctatis; tibiis anticis et intermediis paulo curvatis. L. 13 mill. Tonkin. — Voisin de *Jeanvoinei* Pic, en diffère par les pattes antérieures plus robustes, les tibias inermes, etc.

A. rufoposticalis n. sp. Elongatus, postice attenuatus, nitidus, niger, elytris postice rufis, membris rufescentibus, thorace transverso, minute et dense punctato; elytris thorace parum latioribus, striatis, intervallis sub-

depressis ; pedibus brevibus. L. 5 mill. Malacca. — Peut se placer près de *diluta* Frm., très caractérisé par sa coloration.

A. cameronensis mihi, de coloration analogue au précédent, avec les élytres peu roussâtres au sommet, s'en distingue par le thorax moins transversal, fortement ponctué, les élytres moins atténués. L. 5 mill. Presqu'île Malaise (Salangor Museum et coll. Pic).

A. atrolateralis mihi, analogue au précédent, mais plus allongé, et très caractérisé par sa coloration générale rousse avec les côtés des élytres assez largement noirs ; le thorax un peu transversal est fortement et densément ponctué, triimpressionné postérieurement. L. 5,5-6 mill. Presqu'île Malaise (Salangor Museum et coll. Pic).

A. brevipubens n. sp. Angustatus, nitidus, breve griseo pubescens, nigro-cyanescens, elytris, abdomine membrisque rufis ; thorace transverso, sat fortiter et dense punctato ; elytris thorace paulo latioribus, elongatis, postice attenuatis, striatis, intervallis subconvexis, sat fortiter punctatis. L. 11 mill. Pahang. — A placer près de *fortiterpunctata* Pic.

A. curvatipes n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, niger ; thorace subquadrato, antice attenuato, parum fortiter sat dense punctato ; elytris thorace distincte latioribus, parum elongatis, postice attenuatis, fortiter striatopunctatis, intervallis convexis ; pedibus robustis, tibiis diverse curvatis. L. 9 mill. Bornéo. — A placer près de *suturalis* Bor.

A. annulatipes n. sp. Elongatus, antice et postice attenuatus, castaneus, elytris pubescentibus, pedibus luteis, femoribus ad basin et ad apicem piceis, his parum crassis, tibiis diverse dentatis ; thorace breve, sat lato, parum fortiter et dense punctato, postice minute triimpresso ; elytris thorace parum latioribus, elongatis, sat

fortiter striato-punctatis, intervallis subconvexis, impunctatis. L. 12 mill. Bornéo. — Voisin de *bruneiensis* Pic, plus allongé, intervalles des élytres étroits, sans ponctuation appréciable.

A. Dauphini n. sp. E'longatus, nitidus, rufescens, pro parte castaneus, capite antice membrisque luteis; thorace parum lato, antice attenuato, parum fortiter sat dense punctato; elytris thorace valde latioribus, parum elongatis, postice attenuatis, sat fortiter striato-punctatis, intervallis subconvexis, impunctatis; pedibus sat elongatis. L. 13 mill. Bornéo. — Peut se placer près de *hirtipes* Bor. Dédié à la mémoire de mon collègue bourbonnais.

A. Rouyeri n. sp., de Java, de coloration générale noire, se distingue, à première vue, de *obscuripes* Pic, par les élytres plus longs, à stries profondes, les intervalles subconvexes, sans ponctuation appréciable. L. 14 m.

A. palembanga n. sp. Elongatus, antice et postice valde angustatus, nitidus, piceo-metallicus, elytris rufescentibus; capite thoraceque minute, parum dense punctatis, illo subtransverso; elytris thorace paulo latioribus, longe attenuatis, intervallis sat latis, subdepressis, minute punctatis. L. 15 mill. Sumatra. — Voisin de *cuneipennis* Fm., coloration plus claire.

A. kinabaluensis n. sp. Elongatus, antice et postice attenuatus, niger, elytris rufescentibus, pedibus brevibus, nigris, femoribus ad basin late luteis; thorace parum breve, sat lato, antice attenuato, fortiter et dense punctato; elytris thorace paulo latioribus, parum elongatis, postice valde attenuatis, striatis, intervallis subdeplanatis, multi punctatis. L. 12 mill. Kinabalu. — A placer près de *bruneiensis* Pic, plus allongé, thorax plus densément ponctué.

A. Soekaboemiana n. sp. De coloration noire, avec les élytres un peu châains, ayant le faciès du précédent

et s'en distinguant par la ponctuation moins rapprochée du thorax, les élytres plus longs, à intervalles moins ponctués, les pattes foncées. L. 14 mill. Java.

A. Modiglianii n. sp. Oblongus, nitidus, piceus, elytris membrisque rufis ; capite thoraceque fortiter et dense punctatis ; elytris latis et brevibus, postice attenuatis, supra paulo depressis, fortiter striato-punctatis, intervallis costulatis. L. 6 mill. Mentawai. — A placer près de *minuta* Pic.

A. camariiformis n. sp. Oblongo-elongatus, parum nitidus, niger, capite diverse punctato ; thorace valde transverso, minute et sparse punctato ; elytris latis, parum elongatis, apice attenuatis, minute striato-punctatis, intervallis latis, diverse, pro parte sat latis. L. 11 mill. Sumatra. — Forme particulière, mimant le genre *Acantho-camaria* Geb.

A. Kannegieteri n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, niger, capite antice rufescente, fortiter punctato ; thorace subquadrato, sat minute et dense punctato ; elytris thorace valde latioribus, parum elongatis, postice attenuatis, fortiter striato-punctatis, intervallis convexis, fere impunctatis. L. 13 mill. Sumatra. — Voisin de *suturalis* Bor., élytres plus longs et coloration générale noire.

A. vilipes n. sp. Elongatus, antice et postice attenuatus, nitidus, niger, elytris rufis ; capite thoraceque sat fortiter et parum dense punctatis, illo subquadrato, antice paulo attenuato ; elytris thorace valde latioribus, postice attenuatis, striatis, intervallis subconvexis, parum punctatis. L. 10 mill. Java. — Peut se placer près de *vitis* Bor., en diffère au moins par la coloration nettement bicolore du dessus du corps.

Bolbostheta atricolor n. sp. [Héter.]. Oblongus, parum nitidus, niger ; thorace transverso, minute et sparse punctato ; elytris thorace valde latioribus, sat brevibus,

postice attenuatis, striatis, intervallis, subconvexis. Long. 11 mill. Malacca. — Voisin de *longicorne* Pic, aspect moins brillant, élytres moins longs, etc...

B. angustiformis n. sp. Angustatus, subparallelus, apice paulo attenuatus, subopacus, griseo pubescens, niger ; thorace breve et lato, minute non dense punctato ; elytris thorace paulo latioribus, longissimis, striatis et minute punctatis, intervallis subconvexis ; femoribus parum robustis. L. 11 mill. Presqu'île Malaise (Salangor Museum et coll. Pic). — Plus petit et bien plus étroit que *B. major* Pic.

Ommatochara madurensis n. sp. [Héter.]. Oblongo-elongatus, convexus, antice et postice attenuatus, convexus, nitidus, rufo-castaneus, thorace transverso, minute et dense punctato ; elytris thorace paulum latioribus, attenuatis, striatis, intervallis subconvexis, distincte punctatis ; pedibus parum validis. L. 10 mill. Indes Mér.

Antixoon latum n. sp. [Malac.]. Oblongo-elongatus, parum nitidus, sparse griseo pubescens et paulo hirsutus, nigro-subæneus, capite antice, elytris circa et ad basin pedibusque testaceis ; antennis nigris, brevibus, articulis ultimis tribus latioribus ; thorace breve et lato, lateraliter subarcuato, fortiter et dense punctato ; elytris subparallelis, apice attenuatis, marginatis, fortiter punctato-pupillatis. L. 3 mill. R. Argentine. — Diffère de *cribripenne* Gorh. par la forme plus large, la coloration plus foncée.

A. longipenne mihi, du Chili, de coloration analogue au précédent, mais avec les élytres plus largement testacés au sommet avec la suture longuement testacée ; se distingue, en outre, du précédent, par les élytres plus longs à ponctuation non pupilleuse et plus régulière.

Autorisation Ph 810

M. Pic.

Moulins, Les Imprimeries Réunies. C. O. du Livre 31.0097



SciELO/MZUSP